

Getreideherbizide für den Herbsteinsatz (Auswahl)

Produkt	Wirkstoff	HRAC ⁴⁾ Einstufung alt neu		Aufwand- menge/ha	Getreideart ¹⁵⁾	Anwendungs-zeit (BBCH Stadien)	Kleienabkraut	Kamillearten	Vogelmiere	Ehrenpreisarten	Taubnesselarten	Stiefmütterchen	Ausfallraps	Kornblume	Windhalm	Ackerfuch- schwanzgras, Raygräser	ca. Preise /ha ¹⁾	Abstände zu Oberflächen- gewässern in m ²⁾	Abstände zu Gewässern bei Abtragsungsgefahr in m ³⁾	
Arnold ¹³⁾	Diiflufenican + Flufenacet	12,15	F1,K3	0,6* l	WG,WWW	VA, NA (10-13)	+++	++(+)	+++	++(+)	+++	+++	+++	++(+)	+++	+++ (0,6 l)		20/10/5/5	G-20	
Axial 50 ⁶⁾	Pinoxaden	1	A	0,9 l	WG, WR, WHW, WWW, WT, DI	NA (13-29)	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	+++	48,60	1/1/1/1	-	-
Battle Delta ^{9,13)} /Nucleus ^{9,13)}	Diiflufenican + Flufenacet	12,15	F1,K3	0,5-0,6* l	WG, WR, WWW, WHW, WT, DI	VA, NA (10-13)	+++	++(+)	+++	++(+)	+++	+++	+++	++(+)	+++	+++ (0,6 l)		-/-/-15	G- -/-/-20	-
Battle Delta Flex ^{9,13)} (Battle Delta + BeFlex)	Diiflufenican + Flufenacet + Beflubutamid	12,15,12	F1,K3,F1	0,33 + 0,33 l	WG, WWW	NA (10-13)	+++	++(+)	+++	++(+)	+++	+++	+++	++(+)	+++	+++ (0,5+0,5 l)		-/-/-15	G- -/-/-20	-
Boxer + Cadou SC ¹⁴⁾	Prosulfocarb + Flufenacet	15	N (K3), K3	2,0-2,5 +0,4* l	DI, WG, WHW, WR, WWW, WT	VA, NA (10-13)	+++	++	+++	+++	+++	++	+	+	+++	+++ (0,5 l)		15/10/5/1	n.z.	
Boxer + Express SX	Prosulfocarb + Tribenuron- methyl	15,2	N (K3), B	2,5 l + 25 g	DI, WG, WR, WHW, WT, WWW	NA (ab 13)	+++	+++	+++	++	+++	+++	+++	++(+)	+++	++	48	15/10/5/1	n.z.	
Cadou SC ¹⁴⁾	Flufenacet	15	K3	0,3-0,5* l	DI, WG, WHW, WR, WWW, WT	VA, NA (bis ES 13)	++(+)	++(+)	+	-	++(+)	+	-	-	+++	+++ (0,5 l)		1	G-5 (0,3 l) G-10 (0,5 l)	-
Carmina Perfekt (Carmina 640 + Saracen Delta) ⁷⁾	Chlortoluron + Diiflufenican + Florasulam	5,12,2	C2, F1, B	1,5 l + 75 ml	WG, WR, WHW, WWW, WT	NA (12-23)	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+	45,9	20	G-20	-
Carpatus SC ¹³⁾	Diiflufenican + Flufenacet	12,15	F1,K3	0,4-0,6* l	WG, WR, WWW, WT	VA, NA (10-13)	+++	++(+)	+++	++(+)	+++	+++	+++	++(+)	+++	+++ (0,6 l)		-/20/10/5	G- -/20/20/20	-
Diflanil 500 SC	Diiflufenican	12	F1	0,25-0,375 l	WG, WWW	NA (10-14)	++	++	+++	+++	+++	+++	++	++	(+)	-	13,40-20,10	-/40/20/10	G- -/40/20/20	-
Fantasia	Prosulfocarb	15	N (K3)	2,5 - 5 l	WG, WR, WHW, WWW, WT	VA, NA (10-21)	+++	+	+++	++	+++	+	+	+	+++	+	24,1-48,1	15/10/5/1	n.z.	
Fence ^{11,13)}	Flufenacet	15	K3	0,25-0,5 l	WG, WWW	VA, NA (10-21)	++(+)	++(+)	+	-	++(+)	+	-	-	+++	+++ (0,5 l)		1	G--10	-
Flash 500 SC	Diiflufenican	12	F1	0,28-	WG, WWW	V, NA (10-14)	++	++	+++	+++	+++	+++	++	++	(+)	-	9,3	15/10/5/5	G-20	-
Fluent 500 SC ^{11,13)}	Flufenacet	15	K3	0,4 l	WG, WR, WWW, WT	NA (10-13)	++(+)	++(+)	+	-	++(+)	+	-	-	+++	+++		1	G--10	-
Jura	Prosulfocarb + Diiflufenican	15,12	N (K3),F1	3,5- 4,0 l	WG, WR, WHW, WWW, WT, DI	VA, NA (10-13)	+++	++(+)	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+	50,60-57,80	15/10/5/1	G-15/10/10/10	-
Jura + Glosset SC ^{10,13)}	Prosulfocarb + Diiflufenican + Flufenacet	15,12,15	N (K3),F1,K3	3,5- 4,0 + 0,4 l	WG, WR, WWW, WT	VA, NA (10-13)	+++	++(+)	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+++		15/10/5/1	G-15/10/10/10	-
Jura Max	Prosulfocarb + Diiflufenican	15,12	N (K3),F1	3 l	WG, WR, WHW, WWW, WT, DI	VA, NA (10-13)	+++	++(+)	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+	?	20/10/10/10	G-20	-
Lentipur 500 ⁹⁾	Chlortoluron	5	C2	2,0 - 3,0 l	WG, WR, WHW, WWW ⁹⁾ , WT	VA (WWW,WHW); NA (ab 13-WG, WHW,WR,WT,WWW)	-	+++	+++	+	++(+)	+	-	++(+)	+++	++(+)	25,2-37,9	1	G-5	-
Kwizda Getreidepack- Herbst (Nucleus ^{9,13)} + Express SX)	Diiflufenican + Flufenacet + Tribenuron- methyl	12,15,2	F1, K3, B	0,33 l + 20 g	WG, WR, WHW, WWW, WT, DI	NA (10-13)	++(+)	++(+)	+++	++(+)	+++	+++	+++	++(+)	+++	+++ (0,6 l)		-/-/-15	G- -/-/-20	-
Mateno Pack (Cadou SC ¹⁴⁾ + Mateno Duo)	Flufenacet + Diiflufenican + Aclonifen	15,12,34	K3, F1, S(F3)	0,25 + 0,35 l	DI, WG, WHW, WR, WT, WWW	VA, NA (10-13)	++(+)	++(+)	+++	+++	+++	+++	+++	+	+++	+++ (0,5 l)		10 (WG,WR) 20 (WWW,WT)	G-5	-
Mateno Pack (Cadou SC ¹⁴⁾ + Mateno Duo) + Express SX ¹²⁾	Flufenacet + Diiflufenican + Aclonifen + Tribenuron- methyl	15,12,34,2	K3, F1, S(F3), B	0,25 + 0,35 l + 20 g	WG, WR, WT, WWW	NA (10-13)	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++(+)	+++	+++ (0,5 l)		10 (WG,WR) 20 (WWW,WT)	G-5	-
Mateno Trio Set (Mateno Duo + Cofeno)	Diiflufenican + Aclonifen + Prosulfocarb	12,24,15	F1, S(F3), N	0,35 + 1,5-3,0 l	DI, WG, WHW, WR, WT, WWW	VA, NA (10-13)	+++	++(+)	+++	+++	+++	+++	+++	+	+++	+++ (3,0 l; VA))	27,1	VA: 15/10/5/5 NA: 15/10/5/1	n.z.	
Mateno Trio Set (Mateno Duo + Cofeno) + Express SX	Diiflufenican + Aclonifen + Prosulfocarb + Tribenuron-	12,24,15,2	F1, S(F3), N, B	0,35 + 1,5-3,0 l + 25 g	DI, WG, WHW, WR, WT, WWW	NA (10-13)	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++(+)	+++	+++ (3,0 l; VA))	?	VA: 15/10/5/5 NA: 15/10/5/1	n.z.	
Pontos ¹³⁾	Picolinafen + Flufenacet	12,15	F1,K3	0,5 - 1,0 l	WG, WHW, WR, WW, WT, DI	VA (1 l), NA (10-29, 0,5 l)	++(+)	++(+)	+++	+++	+++	+++	++	++(+)	+++	+++ (1 l)		15/10/5/1	G-20	-
Pontos ¹³⁾ + Express SX ¹²⁾	Picolinafen + Flufenacet+Tri- benuron-methyl	12,15,2	F1,K3,B	0,5 l + 20 g	WG, WHW, WR, WW, WT, DI	NA (13-29)	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++(+)	+++	+++ (1 l)		15/10/5/1	G-20	-

Getreideherbizide für den Herbsteinsatz (Auswahl)

Produkt	Wirkstoff	HRAC ⁴⁾ Einstufung alt neu	Aufwand- menge/ha	Getreideart ¹⁵⁾	Anwendungs-zeit (BBCH Stadien)	Klettenabkraut	Kamillearten	Vogelmiere	Ehrenpreisarten	Taubnesselarten	Stiefmütterchen	Ausfallraps	Kornblume	Windhalm	Ackerfuchsschwanzgras, Raygräser	ca. Preise /ha ¹⁾	Abstände zu Oberflächen- gewässern in m ²⁾	Abstände zu Gewässern bei Abtragungsgefahr in m ³⁾	
Roxy 800 EC + Diflanil 500 SC	Prosulfocarb + Diflufenican	15,12	N (K3),F1	2,5 l + 0,25 l	WG, WWW	NA (10-13)	+++	++(+)	+++	+++	+++	++	++	+++	+	41	-/40/20/10	n.z.	
Saracen + Lentipur 500 ⁵⁾	Florasulam + Chlortoluron	2,5	B, C2	75 ml + 1,5 l	WG, WR, WHW, WWW, WT	NA (10-13)	+++	+++	+++	+	+	+	+++	+++	+	28,3	1/1/1/1	15	-
Stomp Aqua	Pendimethalin	3	K1	3,5 l	WG, WR, WWW, WT	VA, NA (10-13)	++	++	+++	+++	+++	+	-	+(+)	(+)	77,00	20/20/10/5	G-5	20/20/10/5
Stomp Aqua + Lentipur 500 ⁵⁾	Pendimethalin + Chlortoluron	3,5	K1,C2	2 -(3) + 1,5 l	WG, WR, WWW ⁵⁾ , WT	VA, NA (13)	++(+)	+++	+++	+++	+++	++	+	+++	+(+)	63-85	20/20/10/5	G-5	20/20/10/5
Stomp Perfekt (Stomp Aqua + Carmina 640 ⁷⁾)	Pendimethalin + Chlortoluron + Diflufenican	3,5,12	K1,C2,F1	2,0 + 1,0	WG, WR, WWW, WT	NA (10-29, DI 10-25)	++(+)	+++	+++	+++	+++	+++	++	+++	+(+)	48,00	20/20/10/5	G-20	-
Trinity ⁸⁾	Pendimethalin + Chlortoluron + Diflufenican	3,5,12	F1,K1,C2,F1	2,0 l	WG, WR, WT, WWW	VA, NA (10-13)	++(+)	+++	+++	+++	+++	+++	++	+++	+(+)	45,60	-/20/15/5	G- /20/20/20	-
Viper Compact	Penoxsulam + Florasulam + Diflufenican	2,2,12	B,B,F1	1 l	WG, WR, WT, WHW, WWW, DI	NA (10-29)	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	+++	+	35,7-37,6	-/20/10	G-20	
Viper Compact + Lentipur 500 ⁵⁾	Penoxsulam + Florasulam + Diflufenican + Chlortoluron	2,2,12,5	B,B,F1,C2	0,75 + 1,5 l	WG, WHW, WWW ⁵⁾ , WR, WT	NA 13-29)	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	+++	+	45,70	-/20/10	G-20	
Viper Compact + Axial 50	Penoxsulam + Florasulam + Diflufenican + Pinoxaden	2,2,12,1	B,B,F1,A	0,75 + 0,9 l	WG, WHW, WWW, WR, WT, DI	NA (13-29)	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	+++	+++	75,4	-/20/10	G-20	

Legende:

+++ sehr gut wirksam
 ++ gut wirksam
 + schwach wirksam
 - unwirksam

rot: Zusatzwirkung

1) ca. Preise 2025/26, größtes Gebinde, exkl. MwSt.
 2) Regelabstand/50/75/90 % Abtriftminderungsklasse
 3) Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein jeweiliger Mindestabstand in Meter (je nach Düse kann er unterschiedlich sein) und wenn angegeben ein bewachsener Grünstreifen (mit G und Meterangabe-gekennzeichnet) einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden - außer wenn extra angegeben; n.z. bedeutet, dass bei Abtragsgefährdung die Anwendung nicht zulässig ist; mit Maßnahmen, wie z.B. Unkrautbekämpfung im Nachauflauf, Bodenbedeckung mit Mulch, Begrünungen, Zwischenfrüchte, rauhes Saatbett, Grünstreifen und Querdämme kann das Risiko reduziert werden.
 4) Klassifizierung des Wirkungsmechanismus; Resistenzvermeidung durch Verwendung von Produkten aus verschiedenen Gruppen
 5) nur 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode; bei Anwendung im WW im VA nur alle 2 Jahre auf der selben Fläche erlaubt; keine zusätzlichen Anwendungen mit anderen, diesen Wirkstoff enthaltenden Mitteln; Sorteneinschränkung bei WW bei 3,0 l/ha
 6) Mischbarkeit beachten
 7) Keine Anwendung auf drainierten Flächen
 8) Keine Anwendung auf gedrahteten Flächen zw. 1.11. und 15.3.
 9) Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode, wobei die Anwendung nur alle 2 Jahre auf derselben Fläche erfolgen darf.
 10) Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode, wobei die Anwendung nur alle 2 Jahre auf derselben Fläche erfolgen darf.
 Keine zusätzlichen Anwendungen mit anderen Mitteln, die den Wirkstoff Flufenacet enthalten.
 11) Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode, wobei die Anwendung nur alle 3 Jahre auf derselben Fläche erfolgen darf.
 Keine zusätzlichen Anwendungen mit anderen Mitteln, die den Wirkstoff Flufenacet enthalten.
 12) statt 20 g/ha Express SX sind als Mischpartner auch 40 g/ha Flame Duo möglich
 13) bis 10.12.2026 zu verbrauchen
 14) bis 5.12.2025 zu verbrauchen
 * Aufwandmenge auf schweren Böden
 15) Abkürzung Kulturen (EPPO-Code)DI-Dinkel (3SPEC); G-Gerste (3BARC); Getreide (3CERC); H-Hafer (3OATC); R-Roggen (3RYEC); T-Triticale (3TRIC); W-Weizen (3WHEC); SG-Sommergerste (SECCS); SH-Sommerhafer (AVESP); SHW-Sommerhartweizen (TRZDS); ST-Sommertriticale (TTLSO); SWW-Sommerweichweizen (TRZAS); WG-Wintergerste (HORVW); WH-Winterhafer (AVESW); WHW- Winterhartweizen (TRZDW); WR-Winterroggen (SECCW); WT- Wintertriticale (TTLWI); WWW-Winterweichweizen(TRZAW); WDI-Winterdinkel (3SPWC)